

Effect of Carbon Black and Zinc-Solubilizing Bacteria on the Chemical Distribution of Zinc in Soil under Salinity Stress

S. Raeisi¹, N. Rangzan¹ and N. Enayatzamir^{2*}

1. Master's Graduate and Associate Professor, Department of Soil Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2. Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

Received: 16 November 2024 Accepted: 6 January 2025 *Corresponding Author: n.enayatzamir@scu.ac.ir

Abstract

Introduction: Zinc (Zn) is an essential nutrient for plants, required in small amounts for reproductive and physiological functions. Zinc deficiency is common in soils with high pH, low organic matter, and high calcium carbonate. Soil salinity is a major environmental stress affecting zinc availability, with varied impacts on its chemical forms. Soluble and exchangeable zinc forms are the most mobile and available for plants, while residual zinc forms are less active. Depending on soil properties, carbonate-bound, iron and manganese oxide-bound, and organic zinc forms are relatively active and potentially available for plants. Organic materials like carbon black can influence zinc distribution, and zinc-solubilizing bacteria enhance zinc availability by converting insoluble forms into soluble ones. This study investigates the effects of carbon black and growth-promoting bacteria on zinc forms and soil properties under different salinity levels.

Materials and Methods: In this study, a pot experiment with four replications was conducted to investigate the effect of carbon black and the inoculation of a mixture of two bacteria on the distribution of chemical forms of zinc under salinity stress. The experiment was conducted as a factorial in a completely randomized design with three factors: salinity (2, 5, and 8 dS m⁻¹), carbon black (0 and 4% by weight), and a mixture of two bacteria (inoculated and non-inoculated). The bacteria used in this study included *Enterobacter cloacae* and *Bacillus* sp., both of which were obtained from the microbial collection of the Soil Science Department at Shahid Chamran University of Ahvaz. The experiment was carried out in 2023 in the greenhouse of Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University. In 5-kilogram pots, 10 corn seeds were planted and later thinned to 6 plants per pot after germination. Three months after planting, soil samples were taken from the pots. After removing the roots and passing the soil through a 2-mm sieve, the samples were transferred to the laboratory to determine the chemical forms of zinc. The sequential extraction method was used to determine the chemical forms of zinc. The fractions—exchangeable, carbonate, iron and manganese oxides, organic, and residual—were determined. The concentration of zinc in the extracts obtained from the various stages of sequential extraction of the soil was read using an atomic absorption device. Some biological properties of soil, such as microbial biomass carbon (via fumigation-extraction method), catalase activity (via the titration method), and soil respiration (by titration of residual NaOH), were measured.

Results and Discussion: The interaction effect of carbon black, inoculation, and salinity on the chemical forms of Zn was significant. The results showed that the inoculation of a mixture of two bacteria and the addition of carbon black significantly increased the soluble and exchangeable, carbonate, iron and manganese



oxide, and organic forms of zinc in the soil. At a salinity level of 2 dSm⁻¹, the inoculation of bacteria and addition of carbon black increased EXCH-zinc from 1.02 to 1.38 mg/kg-1, a 35% increase compared to the control. Inoculation of the bacterial mixture and the addition of carbon black to the soil increased all forms of zinc except the residual form. With increasing salinity, soluble and exchangeable, carbonate-bound, and oxide-bound forms increased, while the organic-bound form decreased. The highest microbial biomass carbon, catalase activity, and soil respiration were measured in the treatment with bacteria, carbon black, and at a salinity level of 2 dS m⁻¹, with values of 19.9 mg-Cmic 100g⁻¹, 0.95 mLKMnO₄g⁻¹h⁻¹, and 70.2 mgCO₂ 100g⁻¹day⁻¹, respectively. There was a positive correlation between soil respiration and all forms of zinc, except the residual form, which showed a negative correlation. This indicates the influence of microbial activity on different forms of zinc.

Conclusion: The addition of carbon black to the soil and the inoculation of a mixture of two bacteria converted zinc from its residual form to soluble and exchangeable, carbonate, oxide, and organic forms, increasing the availability of zinc in accessible fractions at various salinity levels. Overall, zinc-solubilizing bacteria offer a promising solution for enhancing zinc availability in saline soils, promoting plant health, and contributing to sustainable agricultural practices.

Keywords: *Bacterium, Catalase activity, Microbial biomass carbon, Soil respiration, Zinc.*

اثر دوده کربن و باکتریهای حل کننده روی بر توزیع شیمیایی روی در خاک تحت تنش شوری

سپیده رئیسی^۱، نفیسه رنگ‌زن^۱ و نعیمه عنایتی ضمیر^{۲*}

۱- به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاتانی، ایران

۲- استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

تاریخچه مقاله

دریافت: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

کلمات کلیدی:

باکتری،

تنفس خاک،

روی،

کربن زیتوده میکروبی،

فعالیت کاتالاز

چکیده

بیشتر خاک‌ها یا کمبود روی دارند یا حاوی روی در شکل غیر قابل دسترس برای گیاه هستند. از طرفی شوری خاک یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین تنش‌های محیطی در جهان است. تاثیر شوری بر شکلهای روی و زیست‌فراهمی آن در خاک متفاوت بوده است. در این مطالعه، به منظور بررسی اثر دوده کربن و مخلوط باکتریایی بر توزیع شکلهای شیمیایی روی تحت تنش شوری، آزمایشی گلدانی با چهار تکرار به صورت فاکتوریل با سه فاکتور شامل شوری در سه سطح (۰، ۲، ۵ و ۸ دسی زیمنس بر متر) و دوده کربن در دو سطح (۰، ۴ درصد وزنی) و مخلوط دو باکتری در دو سطح (مایه‌زنی و بدون مایه‌زنی) در قالب طرح پایه‌ی کاملاً تصادفی در سال ۱۴۰۲ در گلخانه‌ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. برای تعیین شکل‌های شیمیایی روی از روش عصاره‌گیری متوالی استفاده شد. پس از پایان آزمایش کربن زیتوده میکروبی، فعالیت کاتالاز و تنفس خاک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد کاربرد مخلوط دو باکتری و دوده کربن باعث افزایش معنی‌دار شکل‌های محلول و تبادل‌ی، کربناتی، اکسید آهن و منگنز و آلی گردید. مایه‌زنی مخلوط باکتریایی و افزودن دوده کربن به خاک در سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر باعث افزایش شکل محلول و قابل تبادل روی از ۱/۰۲ در خاک بدون اعمال تیمار به ۱/۳۸ میلی‌گرم در کیلوگرم شد که معادل ۳۵ درصد افزایش بود. مایه‌زنی مخلوط باکتریها و افزودن دوده کربن به خاک موجب افزایش تمام شکل‌های روی بجز شکل باقیمانده شد. با افزایش سطح شوری مقدار شکل‌های محلول و تبادل‌ی، کربناتی و اکسیدی افزایش و شکل آلی کاهش یافت. بیشترین مقدار کربن زیتوده میکروبی، فعالیت کاتالاز و تنفس میکروبی خاک در تیمار دارای باکتری، دوده کربن و در سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر به ترتیب با مقادیر $19/9 \text{ mgCmic}100\text{g}^{-1}$ ، $0/95 \text{ mLKMnO}_4\text{g}^{-1}\text{h}^{-1}$ و $\text{mgCO}_2100\text{g}^{-1}$ $70/2 \text{ day}^{-1}$ اندازه‌گیری شد. همبستگی مثبت بین تنفس خاک و تمام شکل‌های روی به جز شکل باقیمانده وجود داشت، اما همبستگی بین

* عهده دار مکاتبات

Email: n.enayatzamir@scu.ac.ir

تنفس خاک و شکل باقیمانده روی منفی بود که نشان دهنده تاثیر فعالیت میکروبی بر شکل های مختلف روی است.

مقدمه

روی یکی از عناصر غذایی ضروری است که گیاه برای انجام فعالیت زایشی و فیزیولوژیکی به مقدار کم به آن نیاز دارد. کمبود روی منجر به کاهش شدید عملکرد و در موارد حاد مرگ گیاه می شود (۳۱).

روی می تواند به اشکال مختلفی، عمدتاً به صورت یون های آزاد Zn^{2+} و $ZnOH^+$ و یا به صورت کمپلکس شده با مواد آلی در خاک وجود داشته باشد. شکل دو ظرفیتی روی در pH خنثی (زیر ۷/۷)، شکل $ZnOH^+$ در pH ۷/۷-۹/۱ و $Zn(OH)_2$ در بالاتر وجود دارد (۳۹). روی همچنین در بخش کلوئیدی خاک همراه با ترکیبات هیومیک، اکسیدهای هیدراته آهن و آلومینیوم یا به عنوان جزء از کانی های ثانویه و ترکیبات نامحلول وجود دارد. رایجترین اشکال روی که در بخش کلوئیدی یافت می شوند $ZnSO_4$ و $ZnHPO_4$ هستند (۱۱ و ۳۹).

مقدار کل روی در خاک ها بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم با میانگین ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم می باشد (۴۵). اگرچه میزان کل روی در خاک ممکن است بالا باشد؛ اما کمبود روی قابل استفاده محتمل است. روی در خاک به چندین شکل شیمیایی شامل محلول در آب، قابل تبادل، جذب شده، کلاته یا کمپلکس شده وجود دارد که از نظر حلالیت و زیست فراهمی برای گیاهان متفاوت هستند. تعادل بین اشکال مختلف تحت تاثیر pH، غلظت روی و سایر کاتیونها، به ویژه آهن و منگنز قرار می گیرد. از میان انواع شیمیایی روی، شکل های محلول و تبدلی بیشترین تحرک و قابلیت جذب توسط گیاهان را دارند (۴۵). بسته به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، شکل های کربناتی و پیوسته به اکسیدهای آهن و منگنز می توانند تحت شرایط خاصی از خاک آزاد شوند و پتانسیل جذب توسط گیاهان را دارند. در حالی

که شکل متصل به مواد آلی و بویژه شکل باقیمانده که در شبکه های بلورین کانی های خاک قرار دارد، بسیار غیرفعال به نظر می رسد و نه به راحتی در محیط آزاد و نه به راحتی توسط گیاهان جذب می شوند (۶).

عوامل خاکی که بر زیست فراهمی روی برای گیاهان تاثیر می گذارند، عواملی هستند که مقدار روی در محلول خاک و جذب-واجذب آن از/به محلول خاک را کنترل می کنند. این عوامل شامل: محتوای کل روی، مقدار رس، مقدار کربنات کلسیم، شرایط اکسایش-کاهش، فعالیت میکروبی در ریزوسفر، وضعیت رطوبت خاک، غلظت عناصر کمیاب دیگر، غلظت عناصر پرنیاز به ویژه فسفر و اقلیم می باشند (۳).

از دلایل اصلی کمبود روی در خاک های ایران: خاک های آهکی با pH بالا (عمدتاً با بیش از ۳۰ درصد آهک، با pH ۸-۸/۵)، مصرف زیاد کودهای فسفره، مقادیر بالای بی کربنات در آب آبیاری، و عدم مصرف کودهای دارای روی گزارش شده است (۴۰). در خاک های آهکی زیست فراهمی روی تحت تاثیر pH خاک، کانی های معدنی، نوع و مقدار آنیون ها در محلول خاک قرار دارد (۵۰). مطالعه پیشین نشان داده است که در خاک ایران روی عمدتاً در بخش باقیمانده و متصل به کربناتها توزیع شده است (۵۷).

شوری یکی از مهم ترین و رایج ترین تنش های محیطی در جهان است. این تنش غیرزنده به طور قابل توجهی تولیدات کشاورزی را کاهش داده و بحران های غذایی ایجاد می کند (۲۸ و ۴۱). شوری معمولاً در خاک های کشاورزی آبی، به ویژه در مناطق با بارندگی کم و تبخیر و تفرق بالا، مشاهده می شود. مدیریت نادرست آبیاری و روش های ضعیف کشاورزی از علل اصلی شوری خاک هستند (۲۸). تاثیر شوری بر شکل های روی و زیست فراهمی آن در خاک متفاوت بوده است. به عنوان

جوامع میکروبی ریزوسفری بر زیست‌فراهمی روی تاثیرگذار هستند. به باکتری‌های ریزوسفری یا همزیست گیاه که قادرند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با یک یا چند مکانیسم، رشد و نمو گیاه را بهبود بخشند، باکتری‌های محرک رشد گیاه می‌توانند رشد گیاه را مستقیماً با تولید فیتوهورمون‌ها، تثبیت نیتروژن، انحلال فسفات، تولید سیدروفور، تسهیل جذب مواد مغذی از خاک و به طور غیرمستقیم با کنترل زیستی عوامل بیماری‌زا بهبود بخشند (۳۵).

باکتری‌های حل‌کننده روی^۵ می‌توانند روی غیرقابل استفاده را به شکل قابل استفاده تبدیل کنند (۴۳). نقش اصلی این باکتری‌ها در انحلال روی، کاهش pH از طریق تولید اسیدهای آلی یا معدنی، انحلال روی و به دنبال آن افزایش زیست‌فراهمی این عنصر است (۴۲).

با توجه به تاثیر شوری بر شکل‌های شیمیایی روی در خاک، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دوده کربن و باکتری‌های انحلال‌کننده روی بر شکل‌های شیمیایی روی و برخی ویژگی‌های زیستی خاک تحت سطوح مختلف شوری بود.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال ۱۴۰۲ در گلخانه گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، واقع در ملاتانی (۳۵ کیلومتری شمال شرقی اهواز) انجام گردید. نمونه خاک به صورت مرکب (۳۰-۰ سانتی‌متری خاک) تهیه شد. برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله بافت خاک به روش هیدرومتری، pH عصاره اشباع با استفاده از pH سنج، شوری با استفاده از دستگاه شوری‌سنج، پتاسیم محلول به روش فلیم فتومتری، مقدار فسفر خاک به روش اولسن (۳۴)، روی کل به روش هضم با اسید نیتریک (۳۰) و روی قابل تبادل

مثال، آکوستا و همکاران^۱ (۲۰۱۱) و شومان و همکاران^۲ (۱۹۸۶) گزارش دادند که افزایش شوری بر جذب روی در خاکهای معتدل تأثیر نمی‌گذارد؛ در حالی که لینده و همکاران (۲۰۰۷) و چو و همکاران^۳ (۲۰۱۵) گزارش کردند که جذب روی با افزایش شوری کاهش می‌یابد. پس از استفاده از کودهای محلول روی در خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه‌خشک، ۹۶ تا ۹۹ درصد از روی محلول و قابل استفاده به شکل‌های غیرقابل استفاده تبدیل می‌شود (۴۳). تغییر شکل روی در خاکهای آهکی نسبت به خاکهای اسیدی یا خنثی پیچیده‌تر است (۵۴).

مواد آلی نقش کلیدی در تنظیم زیست‌فراهمی روی در خاک دارند. این مواد با گذشت زمان روی را آزاد کرده و از طریق تغییرات در خواص فیزیکوشیمیایی خاک، زیست‌فراهمی آن را برای ریشه‌ها افزایش می‌دهند (۱۰). کلمنته و همکاران^۴ (۲۰۱۰) دریافتند که روی قابل استخراج با افزایش محتوای کربن آلی در خاک افزایش می‌یابد (۱۴). مواد آلی باعث افزایش حلالیت روی در خاک می‌شود. مواد آلی اضافه شده به خاک روی را به محلول خاک آزاد می‌کنند که این امر به روی اجازه می‌دهد تا با سایر اجزای خاک کمپلکس شود و در نتیجه حلالیت آن تغییر کند (۱۲). با این حال، اگر مقدار مواد آلی در خاک بیش از حد بالا باشد، مانند خاکهای پیت و مردابی، این امر می‌تواند به کاهش زیست‌فراهمی روی منجر شود؛ زیرا روی به بخش جامد مواد هیومیک متصل می‌شود (۱۷).

دوده کربن به عنوان اصلاح‌کننده آلی دارای سطح جذب زیادی است، ویژگی‌های شیمیایی خاک را بهبود می‌بخشد و با تقویت فعالیت‌های زیستی و میکروبی باعث بهبود کیفیت خاک می‌گردد (۹).

1- Acosta *et al.*

2- Shuman *et al.*

3- Chu *et al.*

4- Clemente *et al.*

رئسی و همکاران: اثر دوده کربن و باکتریهای حل کننده روی بر...

پی در پی خاک با استفاده از دستگاه جذب اتمی (Contr AA300) قرائت شد.

دقت روش عصاره گیری پی در پی در استخراج کامل شکل های روی در خاک با محاسبه درصد بازیابی تعیین گردید. درصد بازیابی شکل های روی از نسبت مجموع غلظت روی در شکل های مختلف اجزاء خاک (محلول و تبادل، کربناته، اکسیدی، آلی و باقیمانده) به مقدار کل عنصر عصاره گیری شده ضرب در ۱۰۰ محاسبه شد (۴۷). برخی ویژگی های بیولوژیکی خاک در انتهای آزمایش اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری مقدار تنفس پایه از روش تیتراسیون استفاده شد (۴). بشر حاوی ۲۵ میلی لیتر سود ۰/۲۵ نرمال درون ظرف حاوی ۲۵ گرم خاک ریزوسفری قرار داده شد، سپس درب ظرف را بسته و به مدت ۲ روز در دمای اتاق نگهداری شد. پس از آن به بشر حاوی سود چند قطره کلرید باریم ۰/۵ نرمال و چند قطره فنل فتالین اضافه گردید، سپس با استفاده از محلول اسید کلریدریک ۰/۳ نرمال تیتراسیون انجام شد. میزان تنفس پایه برحسب میلی گرم دی اکسید کربن متصاعد شده از خاک در واحد روز محاسبه گردید.

برای اندازه گیری مقدار کربن زیتوده میکروبی از روش تدخین-استخراج استفاده شد (۳۲). بدین ترتیب که پس از تدخین خاک با کلروفرم با سولفات پتاسیم ۰/۵ مولار به نسبت ۵ قسمت عصاره گیر به یک قسمت خاک اضافه و به مدت ۳۰ دقیقه تکان داده شدند. این روش برای خاک تدخین نشده از هر نمونه نیز انجام شد. سپس مقدار کربن آلی محلول در عصاره نمونه های تدخین شده و تدخین نشده به روش اکسیداسیون تر و به وسیله تیتراسیون با فروسولفات آمونیوم اندازه گیری شد. کربن زیست توده میکروبی از اختلاف مقادیر کربن آلی محلول خاک در نمونه های تدخین شده و تدخین نشده و با در نظر گرفتن ضریب ۰/۴۵ به عنوان راندمان تجزیه کربن زیست توده میکروبی، برحسب میلی گرم کربن در صد گرم خاک محاسبه شد.

به روش عصاره گیری با DTPA اندازه گیری شد (۲۶). خاک مورد استفاده دارای بافت لومی، با pH معادل ۷/۳، هدایت الکتریکی 8 dSm^{-1} ، آهک ۳۷ درصد، پتاسیم ۱۶۲ میلی گرم بر کیلوگرم، فسفر ۲۹ میلی گرم بر کیلوگرم، مقدار روی کل و قابل استخراج با DTPA به ترتیب ۶۸/۵ و ۱/۱ میلی گرم بر کیلوگرم بود.

برای رسیدن به سطوح شوری ۲ و ۵ دسی زیمنس بر متر، خاک تحت آبخوبی قرار گرفت. دوده کربن از شرکت کربن ایران تهیه شد که دارای سطح ویژه ۱۱۵-۱۰۰ مترمربع در گرم و مقدار pH در عصاره ۱:۵ معادل ۸/۵ بود. باکتری های مورد استفاده شامل *Bacillus sp.* و *Enterobacter cloacae* به ترتیب با کد دسترسی KX262849 و OR816114 از کلکسیون میکروبی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تهیه شدند. از کشت شبانه باکتری با کدورت معادل نیم مک فارلند ($10^9 \text{ CFU/ml} \times 1/5$) به منظور مایه زنی به خاک استفاده شد. برای تامین عناصر نیتروژن و فسفر مورد نیاز گیاه کوددهی بر اساس آزمون خاک و توصیه های کودی برای گیاه ذرت سینگل کراس ۷۰۳ انجام شد. دوده کربن به میزان صفر و چهار درصد وزنی با خاک گلدان ها مخلوط شد. در گلدان های ۵ کیلو گرمی ۱۰ عدد بذر ذرت کشت شد که پس از اطمینان از جوانه زنی به ۶ گیاه در گلدان کاهش یافت. آبیاری گلدان ها در حد ظرفیت زراعی با آب مقطر انجام گرفت. پس از گذشت سه ماه از کشت، نمونه خاک از گلدان ها تهیه و پس از جدا نمودن ریشه ها و عبور از الک ۲ میلی متری جهت تعیین شکل های شیمیایی روی به آزمایشگاه انتقال داده شد. برای تعیین شکل های شیمیایی روی در خاک از روش تسیر و همکاران^۱ (۴۹) استفاده شد. در این روش ۵ جزء محلول و تبادل، کربناته، اکسیدهای آهن و منگنز، آلی و باقیمانده تعیین گردید. در نهایت غلظت روی در عصاره های بدست آمده از مراحل مختلف عصاره گیری

کربن در سطح شوری ۵ دسی زیمنس بر متر باعث افزایش ۲۶ درصدی روی نسبت به تیمار شاهد شد. با افزایش سطح شوری مقدار روی در این بخش افزایش نشان داد. در سطوح مختلف شوری، استفاده از باکتری باعث افزایش میزان روی محلول و تبدلی شد. غلظت‌های بالای نمک‌ها ممکن است رفتار شیمیایی فلزات را در خاک تغییر دهند و باعث افزایش یا کاهش زیست‌فراهمی آنها شوند (۸).

تحقیقات زیادی در مورد تأثیر شوری خاک بر تحرک فلزات ریزمغذی انجام نشده است. شوری به تغییر قدرت یونی محلول خاک معروف است؛ اما اطلاعات کمی در مورد تأثیر آن بر غلظت ریزمغذی‌های قابل دسترس برای گیاهان موجود است (۷).

افزایش تحرک روی، سرب و مس تحت تأثیر شوری ممکن است به تشکیل کمپلکس‌های کلرید محلول و پایدار نسبت داده شود. به دلیل حلالیت و تحرک بالای یونهای کلرید در خاک، یکی از عوامل تأثیرگذار بر حلالیت و تثبیت فلزات کمیاب در خاک، تشکیل کمپلکس با لیگاندهای معدنی مانند کلر است. کمپلکسهای کلریدی اغلب نسبت به کاتیونهای فلزی آزاد تحرک بیشتری دارند (۷ و ۱۸). تشکیل کمپلکس‌ها همچنین می‌تواند منجر به افزایش جذب فلزات از طریق انتشار سریعتر به ریشه‌ها و جذب بیشتر شود. چنین کمپلکس‌هایی بار مثبت کمتری نسبت به یونهای فلزی آزاد دارند یا ممکن است بدون بار باشند، بنابراین تحرک بیشتری دارند (۷).

از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تحرک فلزات در خاک، قدرت یونی بالای محلول خاک است. با افزایش شوری قدرت یونی محلول خاک افزایش می‌یابد. افزایش غلظت اشکال قابل دسترس فلز که به دنبال افزایش قدرت یونی ناشی از شوری بالای خاک رخ می‌دهد، می‌تواند به دلیل رقابت کاتیونها برای مکانهای تبادل خاک به دلیل افزایش محتوای کاتیونی خاک، کاهش فعالیت اولیه کاتیونهای فلزی در محلول، تشکیل جفت‌های یونی بدون بار و کمپلکس شدن با لیگاندهای آنیونی موجود در محلول خاک باشد (۷).

فعالیت آنزیم کاتالاز با روش تیتراسیون استفاده شد (۲۱). بدین ترتیب که به ۵ گرم خاک مقدار ۴۰ میلی‌لیتر آب مقطر و ۵ میلی‌لیتر محلول آب اکسیژنه ۰/۳ درصد اضافه شد. سوسپانسیون به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سلسیوس و با سرعت ۱۲۰ دور در دقیقه تکان داده شد. سپس برای متوقف کردن واکنش‌ها، بلافاصله ۵ میلی‌لیتر اسید سولفوریک ۱/۵ نرمال به هر نمونه اضافه شد. نمونه‌ها صاف و با محلول پرمنگنات پتاسیم ۰/۰۵ مولار تا زمانی که محلول به رنگ صورتی ملایم درآید تیترا شدند.

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار شامل شوری (۲، ۵ و ۸ دسی زیمنس بر متر) و دوده کربن (۰، ۴ درصد وزنی) و مخلوط دو باکتری (ماه‌زنی و بدون ماه‌زنی) با نرم‌افزار استات‌تستیک ۸/۱ انجام و میانگین‌ها با آزمون توکی مقایسه شدند.

نتایج و بحث

تأثیر تیمارهای مورد مطالعه بر شکل‌های شیمیایی روی

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها (جدول ۱) بر شکل‌های شیمیایی روی در خاک نشان داد که اثر متقابل دوده کربن، باکتری و شوری در سطح احتمال یک درصد بر شکل‌های شیمیایی روی در بخش تبدلی، کربناته، بخش اکسید آهن - منگنز و بخش متصل به مواد آلی و در سطح پنج درصد بر بخش باقیمانده معنی‌دار بود.

بیشترین مقدار روی محلول و تبدلی در تیمار دارای باکتری، دوده کربن در سطح شوری ۸ دسی زیمنس بر متر با مقدار ۱/۴۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد که نسبت به تیمار بدون باکتری و سطح شوری ۸ دسی زیمنس بر متر ۱۲/۱۲ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). بیشترین اثر تیمار دارای باکتری، دوده کربن در سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر بود که باعث افزایش ۳۰ درصدی روی نسبت به تیمار شاهد در این سطح از شوری شد. تیمار دارای باکتری، دوده

رئسی و همکاران: اثر دوده کربن و باکتریهای حل کننده روی بر ...

معدنی در خاکها در طول کشت را می توان به افزایش معدنی شدن کمپلکس آلی و تولید اسیدهای آلی توسط گیاهان و باکتریها در ریزوسفر نسبت داد (۱۶). استفاده از دوده کربن به عنوان اصلاح کننده آلی با افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک و تغییر در زیست‌فراهمی عناصر ریزمغذی، امکان جذب این عناصر را توسط گیاه بهبود می بخشد (۹).

بیشترین مقدار روی پیوند شده با کربنات‌ها در تیمار دارای باکتری، دود کربن و در سطح شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر به مقدار ۲/۶۲ میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد که نسبت به تیمار بدون باکتری، بدون کربن و در سطح شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر ۱۰/۰۸ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲).

باکتریهای حل کننده روی با مکانیسم‌های مختلفی موجب افزایش انحلال روی نامحلول می شوند، از جمله تولید اسیدهای آلی و سیدروفورها (۱۹ و ۵۱).

در آزمایشی جدایه‌های *Bacillus* انحلال کننده روی از طریق افزایش فعالیت آنزیم‌دی‌هیدروژناز، بتاگلوکوزیداز، ترشح اسیدهای آلی، تولید اکسین، افزایش فعالیت میکروبی و کاهش pH ریزوسفر توانستند روی قابل تبادل در خاک تحت کشت گندم و سویا و همچنین غلظت روی در دانه-گندم را افزایش دهند (۳۶). استفاده از باکتریهای محرک رشد در کشت توت‌فرنگی موجب افزایش محتوای پتاسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز در خاک شد. علاوه بر این، ظرفیت تبادل کاتیونی در تیمارها به طور قابل توجهی نسبت به قبل از کاشت افزایش یافت. افزایش دسترسی به محتوای

جدول (۱) تجزیه واریانس اثر دوده کربن و مایه‌زنی مخلوط دو باکتری به خاک بر شکل‌های مختلف روی در سطوح مختلف شوری.
Table (1) Analysis of variance of the effect of carbon black and inoculation of a mixture of two bacteria into the soil on different forms of zinc at various salinity levels.

RES-Zn	ORG-Zn	FeMnOX-Zn	CAR-Zn	EXCH- Zn	df	Source of variation
باقیمانده	آلی	متصل به اکسیدهای آهن و منگنز	کربناتی	محلول و تبدلی	درجه آزادی	
4.11**	2.45**	0.2*	0.22**	0.15**	1	دوده کربن
						Carbon Black
28.5**	0.76**	0.52**	0.54**	0.30**	1	مایه زنی میکروبی
						Microbial inoculation
10.7**	0.38**	0.20**	0.21**	0.126**	2	شوری
						Salinity
2.58**	0.02**	0.002 ^{ns}	0.003*	0.0003 ^{ns}	1	دوده کربن × مایه‌زنی
						Carbon Black×Inoculation
0.04*	0.008**	0.006**	0.004**	0.009**	2	دوده کربن × شوری
						Carbon Black×Salinity
0.22**	0.006**	0.017**	0.014**	0.011**	2	مایه زنی × شوری
						Inoculation×Salinity
0.039*	0.006**	0.003**	0.005**	0.002**	2	دوده کربن × مایه زنی × شوری
						Carbon Black× Inoculation× Salinity
0.01	0.0005	0.0006	0.0006	0.0003	36	خطا
						Error
1.18	1.45	0.7	1.05	1.43		ضریب تغییرات
						CV

EXCH- Zn: exchangeable Zn, CAR-Zn: Carbonate bound Zn, ORG-Zn: organic bound Zn FeMnOX-Zn: iron and manganese oxide bound Zn, RES-Zn: residual Zn.

جدول (۲) مقایسه میانگین اثر دوده کربن و مایه‌زنی مخلوط دو باکتری به خاک بر شکل‌های مختلف روی در سطوح مختلف شوری.

Table (2) Mean comparison of the effect of carbon black and inoculation of a mixture of two bacteria on different forms of zinc in soil at various salinity levels.

Salinity (dS m ⁻¹) شوری	Without Carbon بدون کربن		With Carbon با کربن	
	without bacteria بدون باکتری	with bacteria با باکتری	without bacteria بدون باکتری	with bacteria با باکتری
EXCH-Zn (mg Kg ⁻¹) روی محلول و تبادلی				
2	1.02 ^l	1.25 ^g	1.20 ^d	1.38 ^{cd}
5	1.15 ⁱ	1.33 ^e	1.29 ^f	1.45 ^b
8	1.32 ^e	1.40 ^c	1.36 ^d	1.48 ^a
CAR-Zn (mg Kg ⁻¹) روی متصل به کربناتها				
2	2.02 ^l	2.30 ^g	2.20 ^h	2.45 ^{cd}
5	2.18 ^h	2.40 ^{ef}	2.32 ^g	2.55 ^b
8	2.38 ^f	2.47 ^c	2.42 ^{de}	2.62 ^a
ORG-Zn (mg Kg ⁻¹) روی متصل به مواد آلی				
2	1.30 ^h	1.60 ^e	1.80 ^c	2.10 ^a
5	1.22 ⁱ	1.38 ^j	1.60 ^e	1.9 ^b
8	1.10 ^j	1.27 ^h	1.45 ^f	1.74 ^d
FeMnOX-Zn (mg Kg ⁻¹) روی متصل به اکسیدهای آهن و منگنز				
2	3.12 ^l	3.40 ^g	3.3 ^h	3.55 ^{cd}
5	3.28 ^h	3.50 ^{ef}	3.41 ^g	3.65 ^b
8	3.48 ^f	3.57 ^c	3.52 ^{de}	3.70 ^a
RES-Zn (mg Kg ⁻¹) روی باقیمانده				
2	60.42 ^a	58.10 ^d	59.20 ^b	57.90 ^d
5	59.20 ^b	57.20 ^g	58.17 ^d	57.10 ^g
8	58.40 ^c	56.70 ^h	57.50 ^f	56.50 ⁱ

توکی در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی داری با هم ندارند. اعداد با حروف یکسان در هر ستون بر اساس آزمون

Numbers followed by same letters in each column are not significantly different according to the Tukey's HSD test at 5% probability level. EXCH-Zn: exchangeable Zn, CAR-Zn: Carbonate bound Zn, ORG-Zn: organic bound Zn FeMnOX-Zn: iron and manganese oxide bound Zn, RES-Zn: residual Zn.

اکسیدها در تیمار دارای باکتری، دوده کربن و در سطح شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر مقدار ۳/۷۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم اندازه‌گیری شد که نسبت به تیمار بدون باکتری، بدون کربن و در سطح شوری ۸ دسی‌زیمنس بر متر ۶/۳ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). تیمار دارای باکتری، دوده کربن در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر متر باعث افزایش ۱۳/۷ درصدی روی و در سطح شوری ۵ دسی‌زیمنس بر متر باعث افزایش ۱۱/۲ درصدی روی نسبت به تیمار شاهد شد. با افزایش شوری مقدار روی پیوند شده با اکسیدها افزایش نشان داد. گزارش شده است که استفاده از باکتری محرک رشد (۵۳) و افزایش سطح شوری باعث افزایش اکسید روی می‌شود (۸). استفاده از

اثر متقابل تیمار دارای باکتری، دوده کربن در سطح شوری ۲ و ۵ دسی‌زیمنس بر متر به ترتیب باعث افزایش ۲۲/۲ درصدی و ۱۶/۹ درصدی روی نسبت به تیمار شاهد شد. با افزایش سطح شوری مقدار روی پیوند شده با کربنات‌ها افزایش نشان داد و استفاده از باکتری باعث افزایش میزان این شکل از روی شد. شوری باعث افزایش شکل کربناتی روی می‌شود (۲۲). گزارش شده است که استفاده از باکتری‌های محرک رشد در خاک با تبدیل شکل‌های با زیست‌فراهمی کمتر به شکل‌های قابل دسترس در خاک آهکی، موجب فراهم شدن شرایط برای رسوب روی در شکل کربناتی و افزایش شکل کربناتی روی است (۸ و ۵۳). بیشترین مقدار روی پیوند شده با

در تیمار دارای باکتری، دوده کربن و در سطح شوری ۸ دسی زیمنس بر متر، ۵۶/۵ میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد که نسبت به تیمار بدون دوده کربن و باکتری ۳/۲ درصد کاهش نشان داد (جدول ۲). بیشترین اثر تیمار دارای باکتری، دوده کربن در سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر بود که باعث کاهش ۴/۱ درصدی روی نسبت به تیمار شاهد در این سطح از شوری شد. تیمار دارای باکتری، دوده کربن در سطح شوری ۵ دسی زیمنس بر متر باعث کاهش ۳/۶ درصدی روی نسبت به تیمار شاهد شد. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از دوده کربن و باکتری باعث کاهش روی باقیمانده شد. با افزایش سطوح شوری این بخش از روی کاهش یافت. احتمالاً این بخش از روی به صورت روی متصل به کربنات‌ها تبدیل شده است. در اثر فعالیت میکروبی و تغییر pH خاک، روی از شکل باقیمانده به شکلهای قابل استفاده تر تبدیل شده است (۴۸).

اعتبارسنجی نتایج جزءبندی شیمیایی

درصد بازیابی عنصر روی از ۹۴ تا ۱۰۶/۳۱ درصد با متوسط ۱۰۰/۹۸ درصد محاسبه گردید. همبستگی نسبتاً بالایی ($r^{**} = 0.94$) بین مجموع غلظت روی در شکل‌های مختلف اجزاء خاک با مقدار کل روی خاک بدست آمد. مقدار متوسط بازیابی روی توسط نوروزی و همکاران^۱ (۲۰۱۴) در خاک‌های تیمار شده با گیاهان پیش کاشت را ۹۱/۸ تا ۱۱۴/۸ درصد گزارش نمودند (۳۳).

تأثیر تیمارهای مختلف بر ویژگی‌های زیستی خاک

اثر متقابل باکتری، دوده کربن و شوری بر فعالیت آنزیم کاتالاز، کربن زیتوده میکروبی و تنفس خاک در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود (جدول ۳).

باکتری و دوده کربن باعث افزایش شکل اکسیدی روی شدند. بر اساس نتیجه به دست آمده دوده کربن و باکتری باعث افزایش روی به شکل آلی شد و دوده کربن تأثیر بیشتری را نسبت به باکتری نشان داد. بیشترین مقدار روی متصل به ماده آلی در تیمار دارای باکتری، دوده کربن و در سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر مقدار ۲/۱ میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد که نسبت به تیمار بدون دوده کربن و باکتری ۶۱ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). با افزایش سطح شوری مقدار روی متصل شده با ماده آلی کاهش نشان داد. ماده آلی در خاک مکان‌هایی را برای جذب سطحی روی فراهم و به مرور زمان به محلول خاک آزاد می‌کند. گروه‌های عاملی با تشکیل کمپلکس می‌توانند غلظت روی را در محلول خاک افزایش دهند (۲۰). اصلاح کننده‌های آلی با ایجاد لیگاندهایی که توانایی کلات کردن فلزات را دارند، باعث افزایش انحلال فلزات می‌شوند و همچنین با کمپلکس شدن با فلزات (به صورت کمپلکس‌های محلول) مانع جذب فلز توسط قسمت‌های باقیمانده خاک می‌گردند (۲۹). نمک‌های محلول پتانسیل اسمزی آب خاک را افزایش می‌دهند (بیشتر منفی می‌شود)، آب را از سلولها خارج می‌کنند که ممکن است از طریق پلاسمولیز میکروپها و ریشه‌ها را از بین ببرد. گیاهان و میکروب‌ها می‌توانند با تجمع اسمولیت‌ها به پتانسیل اسمزی پایین سازگار شوند، اما سنتز اسمولیت‌ها نیاز به مقادیر زیادی انرژی دارد و این منجر به کاهش رشد و فعالیت می‌شود (۵۲). در نتیجه میزان کربن آلی محلول خاک و شکل روی متصل به مواد آلی کاهش می‌یابد (۸). مواد آلی خاک می‌توانند کمپلکس‌های نامحلول با ریزمغذی‌ها تشکیل دهند و در نتیجه آنها را غیرمتحرک کنند. در عین حال، مواد آلی خاک می‌تواند عناصر ریزمغذی را حل کرده و زیست-فراهمی آنها را افزایش دهند. بنابراین، مواد آلی می‌تواند نقش‌های دوگانه‌ای در خاک در رابطه با زیست-فراهمی ریزمغذی‌ها ایفا کنند (۲۴). کمترین مقدار روی باقیمانده

جدول (۳) تجزیه واریانس اثر دوده کربن و مایه زنی مخلوط دو باکتری به خاک بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک در سطوح مختلف شوری.

Table (3) Analysis of variance of the effect of carbon black and inoculation of a mixture of two bacteria into the soil on some biological properties of soil at various salinity levels.

Respiration تنفس	Catalase activity فعالیت کاتالاز	Microbial biomass carbon کربن زیتوده میکروبی	df	Source of variation
95.06**	0.023**	457.57**	1	دوده کربن
289.34**	0.23**	5204.17**	1	Carbon Black مایه زنی میکروبی
150.74**	0.078**	359.41**	2	Microbial inoculation شوری
11.54 ^{ns}	0.002*	7.52 ^{ns}	1	Salinity دوده کربن × مایه زنی
0.86 ^{ns}	0.0008 ^{ns}	5.88 ^{ns}	2	Carbon Black×Inoculation دوده کربن × شوری
6.48 ^{ns}	0.019**	7.70*	2	Carbon Black×Salinity مایه زنی × شوری
12.33*	0.004**	51.52*	2	Inoculation×Salinity دوده کربن × مایه زنی × شوری
3.77	0.004	0.67	36	Carbon Black× [noculation× Salinity خطا
17.43	3.02	8.10		Error ضریب تغییرات
				CV

اندازه گیری شد که نسبت به تیمار بدون باکتری، بدون کربن و در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر متر ۷۶/۶ درصد افزایش نشان داد (شکل ۲). با افزایش سطح شوری مقدار کربن زیتوده میکروبی کاهش نشان داد.

بیشترین مقدار تنفس خاک نیز در تیمار دارای باکتری، دوده کربن و در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر متر اندازه گیری شد که نسبت به تیمار بدون باکتری، بدون کربن و در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر متر ۶۶/۷ درصد افزایش نشان داد (شکل ۳). مطالعات زیادی نشان داده‌اند که شوری فعالیت میکروبی، زیتوده میکروبی و ساختار جامعه میکروبی را کاهش می‌دهد (۵، ۳۸، ۵۵). شوری زیتوده میکروبی را عمدتاً به دلیل تنش اسمزی که منجر به خشک شدن و لیز سلولها می‌شود، کاهش می‌دهد (۵۵).

از طرفی غلظت بالای یون‌ها در شرایط شور می‌تواند اثر سمی بر ریزجانداران خاک داشته باشد (۲۸). تنفس خاک با افزایش شوری خاک کاهش می‌یابد (۲، ۴۴ و ۵۶). افزودن کربن به خاک می‌تواند رشد میکروبی خاک و تولید

بیشترین فعالیت کاتالاز در تیمار دارای باکتری، دود کربن و در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر متر اندازه گیری شد که نسبت به تیمار بدون باکتری، بدون کربن و در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر ۳۹/۷ درصد افزایش نشان داد (شکل ۱). فعالیت کاتالاز در تیمار دارای باکتری و دوده کربن در سطح شوری ۵ و ۸ دسی‌زیمنس بر متر به ترتیب افزایش ۱۹/۱ و ۲۴ درصدی کاتالاز نسبت به تیمار شاهد داشت. با افزایش سطح شوری فعالیت آنزیم کاتالاز کاهش نشان داد. فعالیت کاتالاز خاک، که نشان‌دهنده پاسخ تنش اکسیداتیو میکروبی است، می‌تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر شوری قرار گیرد. در شرایط شور رشد میکروبی و تولید آنزیم مهار می‌شود (۱۵). در این پژوهش استفاده از دوده کربن و باکتری باعث افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز شد. در خاکهای دارای مواد آلی تحمل ریزجانداران به شوری خاک افزایش یافته و فعالیت کاتالاز بهبود می‌یابد (۱۵).


بیشترین مقدار کربن زیتوده میکروبی در تیمار دارای باکتری، دوده کربن و در سطح شوری ۲ دسی‌زیمنس بر متر

رئسی و همکاران: اثر دوده کربن و باکتریهای حل کننده روی بر ...

همبستگی بین ویژگی‌های اندازه‌گیری شده با شکل‌های مختلف روی


با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴ همبستگی مثبت و معنی‌داری بین کربن زیتوده میکروبی و فعالیت کاتالاز خاک با روی متصل به مواد آلی وجود دارد. تنفس خاک با تمام شکل‌های روی بجز بخش باقیمانده همبستگی مثبتی داشت که نشان دهنده تاثیر فعالیت میکروبی با افزایش شکل‌های قابل دسترس روی است.

آنزیم‌های خارج سلولی را تحریک کند (۲۳). فعالیت‌های آنزیمی خاک با زیتوده میکروبی همبستگی مثبت دارد (۳۷). در پژوهش حاضر مشاهده شد مایه‌زنی دو باکتری موجب افزایش تنفس و کربن زیتوده میکروبی خاک شد و در حضور دوده کربن مقدار آن‌ها بیشتر بود.




شکل (۱) تاثیر دوده کربن و مایه‌زنی مخلوط دو باکتری بر فعالیت کاتالاز خاک در سطوح مختلف شوری.

Figure (1) Effect of carbon black and inoculation of a mixture of two bacteria on soil catalase activity at various salinity levels.



شکل (۲) تاثیر دوده کربن و مایه‌زنی مخلوط دو باکتری بر کربن زیتوده میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری.

Figure (2) Effect of carbon black and inoculation of a mixture of two bacteria on soil microbial biomass carbon at various salinity levels.



شکل (۳) تاثیر دوده کربن و مایه زنی مخلوط دو باکتری بر تنفس میکروبی خاک در سطوح مختلف شوری.
Figure (3) Effect of carbon black and inoculation of a mixture of two bacteria on soil microbial respiration at various salinity levels.

جدول (۴) همبستگی پیرسون شکل های مختلف روی با برخی ویژگی های خاک.

Table (4) Pearson correlation of different forms of zinc with some soil properties.

Zn's forms	کربن زیتوده میکروبی Microbial biomass carbon	تنفس خاک Soil respiration	فعالیت کاتالاز Catalase activity
EXCH- Zn محلول و تبدالی	0.1958 ^{ns}	0.4626 ^{**}	0.2381 ^{ns}
CAR-Zn متصل به کربناته	0.1852 ^{ns}	0.4789 ^{**}	0.2386 ^{ns}
FeMnOX-Zn متصل به اکسیدهای آهن و منگنز	0.1885 ^{ns}	0.4801 ^{**}	0.2452 ^{ns}
ORG-Zn متصل به مواد آلی	0.7654 ^{**}	0.7067 ^{**}	0.7403 ^{**}
RES-Zn باقیمانده	-0.1114 ^{ns}	-0.4675 ^{**}	-0.2085 ^{ns}

EXCH- Zn: exchangeable Zn, CAR-Zn: Carbonate bound Zn, ORG-Zn: organic bound Zn, RES-Zn: residual Zn, FeMnOX-Zn: iron and manganese oxide bound Zn.

بخش از روی کاهش یافت. نتایج همبستگی بین ویژگی های زیستی خاک و شکل های روی به ویژه بخش متصل به مواد آلی نشان دهنده تاثیر مخلوط باکتریایی و دوده کربن در سطوح مختلف شوری بر شکل های مختلف روی است.

سپاس گذاری

نویسندگان از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به دلیل فراهم آوردن امکانات انجام این پژوهش و دانشگاه شهید چمران اهواز تشکر و قدردانی می نمایند.

نتیجه گیری

نتایج کاربرد مخلوط باکتریایی و دوده کربن در سطوح مختلف شوری بر توزیع شیمیایی روی، نشان داد که افزودن مخلوط باکتریایی و دوده کربن به خاک موجب کاهش pH خاک و افزایش روی به شکل های محلول و تبدالی، کربناتی، اکسید و آلی شد. با افزایش سطح شوری، مقدار روی پیوند شده با کربناتها و اکسیدها افزایش یافت. استفاده از دوده کربن و باکتری باعث کاهش روی باقیمانده شد و با افزایش سطوح شوری این

Reference

1. Acosta, J.A., Jansen, B., Kalbitz, K., Faz, A. and Martínez-Martínez, S., 2011. Salinity increases mobility of heavy metals in soils. *Chemosphere*, 85(8): 1318-1324. doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.07.046
2. Adviento-Borbe, M.A.A., Doran, J.W., Drijber, R.A. and Dobermann, A., 2006. Soil electrical conductivity and water content affect nitrous oxide and carbon dioxide emissions in intensively managed soils. *Journal of Environmental Quality*, 35(6):1999-2010. doi.org/10.2134/jeq2006.0109
3. Alloway, B.J., 2008. Zinc in Soils and Crop Nutrition. International Zinc Association and International Fertilizer Association, 16.
4. Anderson J.P.E. 1982. Soil respiration. In. *Methods of soil analysis, Part 2, Chemical and microbiological properties*, ed. A.L. American Society of Agronomy, Madison Wisconsin, pp 831-871.
5. Andronov, E.E., Petrova, S.N., Pinaev, A.G., Pershina, E.V., Rakhimgalieva, S.Z., Akhmedenov, K.M., Gorobets, A.V. and Sergaliev, N.K., 2012. Analysis of the structure of microbial community in soils with different degrees of salinization using T-RFLP and real-time PCR techniques. *Eurasian Soil Science*, 45: 147-156. doi.org/10.1134/S1064229312020044
6. Barona, A. and Romero, F., 1997. Relationships among metals in the solid phase of soils and in wild plants. *Water, Air, and Soil Pollution*, 95: 59-74.
7. Bartkowiak, A., Dabkowska-Naskret, H., Jaworska, H. and Rydlewska, M., 2020. Effect of salinity on the mobility of trace metals in soils near a soda chemical factory. *Journal of Elementology*, 25(2). doi.org/10.5601/jelem.2019.24.2.1875
8. Boostani, H. R., Chorom, M., Moezzi, A. A., Karimian, N. A., Enayatizamir, N., and Zarei, M. 2016. The effect of application of plant growth promoting bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi on the distribution of chemical forms of zinc in a calcareous soil with different salinity levels. *Journal of Soil Management and Sustainable Production*, 6(1): 1-24. [In Persian] doi.org/10.22069/ejsms.2016.3001
9. Bozar V., Rang Zan N. and Nadian Qomsheh H. 2010. The effect of carbon black and hair waste on heavy metals uptake and some growth parameters of lettuce and spinach irrigated with metal contaminated water. *Agricultural Engineering*, 42(1): 61-80. [In Persian] doi.org/10.22055/agen.2019.27197.1452
10. Cakmak, I., 2009. Enrichment of fertilizers with zinc: An excellent investment for humanity and crop production in India. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 23(4): 281-289. doi.org/10.1016/j.jtemb.2009.05.002
11. Chahal, D.S., Sharma, B.D. and Singh, P.K., 2005. Distribution of forms of zinc and their association with soil properties and uptake in different soil orders in semi-arid soils of Punjab, India. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 36(19-20): 2857-2874. doi.org/10.1080/00103620500306031
12. Chen, Y., Cui, J., Tian, X., Zhao, A., Li, M., Wang, S., Li, X., Jia, Z. and Liu, K., 2017. Effect of straw amendment on soil Zn availability and ageing of exogenous water-soluble Zn applied to calcareous soil. *PLoS One*, 12(1), p.e0169776. doi.org/10.1371/journal.pone.0169776
13. Chu, B., Chen, X., Li, Q., Yang, Y., Mei, X., He, B., Li, H. and Tan, L., 2015. Effects of salinity on the transformation of heavy metals in tropical estuary wetland soil. *Chemistry and Ecology*, 31(2): 186-198. doi.org/10.1080/02757540.2014.917174

14. Clemente, R., Hartley, W., Riby, P., Dickinson, N.M. and Lepp, N.W., 2010. Trace element mobility in a contaminated soil two years after field-amendment with a greenwaste compost mulch. *Environmental Pollution*, 158(5):1644-1651. doi.org/10.1016/j.envpol.2009.12.006
15. Erdel, E. 2022. Effects of salinity and alkalinity on soil enzyme activities in soil aggregates of different sizes. *Eurasian Soil Science*, 55(6): 759-765.
16. Esitken, A., Yildiz, H.E., Ercisli, S., Donmez, M.F., Turan, M. and Gunes, A., (2010). Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. *Scientia Horticulturae*, 124(1): 62-66. doi.org/10.1016/j.scienta.2009.12.012
17. Hafeez, B.M.K.Y., Khanif, Y.M. and Saleem, M., 2013. Role of zinc in plant nutrition-a review. *American Journal of Experimental Agriculture*, 3(2): 374-391. doi: 10.9734/AJEA/2013/2746.
18. Hanif, M., Bullen, J., Plancherel, Y., Kirby, M., Kirk, G. and Weiss, D., 2024. Significant effect of salinity on zinc adsorption on tropical coastal and floodplain soils. *European Journal of Soil Science*, 75(5), p.e13575. doi.org/10.1111/ejss.13575
19. Haroon, M., Khan, S.T. and Malik, A. 2022. Zinc-solubilizing bacteria: an option to increase zinc uptake by plants. *Microbial Biofertilizers and Micronutrient Availability: The Role of Zinc in Agriculture and Human Health*, pp.207-238. doi.org/10.1007/978-3-030-76609-2_11
20. Herencia, J. F., Ruiz, J. C., Morillo, E., Melero, S., Villaverde, J., and Maqueda, C. (2008). The effect of organic and mineral fertilization on micronutrient availability in soil. *Soil Science*, 173(1): 69-80. doi.org/10.3390/agronomy10101452
21. Johnson J.L., and Temple K.L. 1964. Some variables affecting the measurement of catalase activity in soil. *Soil Science Society of America Journal*, 28 (2): 207-209. doi.org/10.2136/sssaj1964.03615995002800020024x
22. Keshavarz, P., Malakouti, M.J., Karimian, N. and Fotovat, A., (2006). The effects of salinity on extractability and chemical fractions of zinc in selected calcareous soils of Iran. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 8: 181-190.
23. Kuzyakov, Y., 2010. Priming effects: interactions between living and dead organic matter. *Soil Biology and Biochemistry*, 42(9):1363-1371. doi.org/10.1016/j.soilbio.2010.04.003
24. Lakshmi, P.V., Singh, S.K., Pramanick, B., Kumar, M., Laik, R., Kumari, A., Shukla, A.K., Abdel Latef, A.A.H., Ali, O.M. and Hossain, A., 2021. Long-term zinc fertilization in calcareous soils improves wheat (*Triticum aestivum* L.) productivity and soil zinc status in the rice-wheat cropping system. *Agronomy*, 11(7), p.1306. doi.org/10.3390/agronomy11071306
25. Linde, M., Öborn, I. and Gustafsson, J.P., 2007. Effects of changed soil conditions on the mobility of trace metals in moderately contaminated urban soils. *Water, Air, and Soil Pollution*, 183: 69-83. doi.org/10.1007/s11270-007-9357-5
26. Lindsay, W.L. and Norvell, W., (1978). Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. *Soil Science Society of America Journal*, 31: 421-428. doi.org/10.2136/sssaj1978.03615995004200030009x
27. Macêdo, W.V., Sakamoto, I.K., Azevedo, E.B. and Damianovic, M.H.R., 2019. The effect of cations (Na⁺, Mg²⁺, and Ca²⁺) on the activity and structure of nitrifying and denitrifying bacterial communities. *Science of the Total Environment*, 679: 279-287. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.397
28. Machado, R.M.A. and Serralheiro, R.P., 2017. Soil salinity: effect on vegetable crop growth. Management practices to prevent and mitigate soil salinization. *Horticulturae*, 3(2), p.30. doi.org/10.3390/horticulturae3020030

29. Madrid L. (1999). Metal retention and mobility as influenced by some organic residues added to soils: A case study. Pp. 201-223. Magdi Selim, H and K.Iskandar. I. Fate and Transport of Heavy Metals in the Vadose Zone. Lewis Publishers (Washington).
30. McGrath, S.P. and Cunliffe, C.H., 1985. A simplified method for the extraction of the metals Fe, Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Cr, Co and Mn from soils and sewage sludges. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 36(9): 794-798. doi.org/10.1002/jsfa.2740360906
31. Natasha, N., Shahid, M., Bibi, I., Iqbal, J., Khalid, S., Murtaza, B., Bakhat, H.F., Farooq, A.B.U., Amjad, M., Hammad, H.M. and Niazi, N.K., 2022. Zinc in soil-plant-human system: A data-analysis review. *Science of the Total Environment*, 808, p.152024. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152024
32. Nelson D.W. & L.E. Sommers. 1996. Total carbon, organic carbon, and organic matter. In: Sparks, D.L., Page, A.L., Helmke, P.A., Loeppert, R.H., Soltanpour, P.N., Tabatabai, M.A., Johnston, C.T., Sumner, M.E. (Eds.), *Methods of Soil Analysis, Part 3. Chemical Methods*. Soil Sci. Soc. Am. Book Series, Number 5, Madison, WI: 961–1010.
33. Norouzi, M., Khoshgoftarmanesh, A. H., and Afyuni, M. 2014. Zinc fractions in soil and uptake by wheat as affected by different preceding crops. *Soil Science and Plant Nutrition*, 60 (5): 670-678. doi.org/10.1080/00380768.2014.937674
34. Olsen, S. R., C. V. Cole, F. S. Watanabe, and L. A. Dean. 1954. Estimation of available phosphorous in soil by extraction with sodium bicarbonate. USDA. Cric. 939. U. S. Gov. Print. Office, Washington, DC.
35. Ramakrishna, W., Yadav, R. and Li, K., 2019. Plant growth promoting bacteria in agriculture: two sides of a coin. *Applied Soil Ecology*, 138: 10-18. doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.02.019
36. Ramesh, A., Sharma, S. K., Sharma, M. P., Yadav, N., and Joshi, O. P. 2014. Inoculation of zinc solubilizing *Bacillus aryabhatai* strains for improved growth, mobilization and biofortification of zinc in soybean and wheat cultivated in Vertisols of central India. *Applied Soil Ecology*, 73: 87-96. doi.org/10.1016/j.apsoil.2013.08.009
37. Ren, Y., Zhang, L., Yang, K., Li, Z., Yin, R., Tan, B., Wang, L., Liu, Y., Li, H., You, C. and Liu, S., 2020. Short-term effects of snow cover manipulation on soil bacterial diversity and community composition. *Science of The Total Environment*, 741, p.140454. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140454
38. Rousk, J., Elyaagubi, F.K., Jones, D.L. and Godbold, D.L., 2011. Bacterial salt tolerance is unrelated to soil salinity across an arid agroecosystem salinity gradient. *Soil Biology and Biochemistry*, 43(9):1881-1887. doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.05.007
39. Sadeghzadeh, B. and Rengel, Z., 2011. The molecular and physiological basis of nutrient use efficiency in crops. Hawkesford, M and Barraclough, P (Eds.), In *The molecular and physiological basis of nutrient use efficiency in crops* (pp. 335-375). John Wiley & Sons Ltd, Chichester West Sussex, UK. doi.org/10.1002/9780470960707
40. Saffari, M., Yasrebi, J., Karimian, N. and Shan XiaoQuan, S.X., 2009. Effect of calcium carbonate removal on the chemical forms of zinc in calcareous soils by three sequential extraction methods. *Research Journal of Biological Science*, 4(7): 858-865.
41. Salem EMM, Kenaway MKM, Saady HS, Mubarak M (2021) Soil mulching and deficit irrigation effect on sustainability of nutrients availability and uptake, and productivity of maize grown in calcareous soils. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 52:1745–1761. doi.org/10.1080/00103624.2021.1892733
42. Sarathambal, C., Thangaraju, M., Paulraj, C., and Gomathy, M. 2010. Assessing the Zinc solubilization ability of *Gluconacetobacter diazotrophicus* in maize rhizosphere using labelled 65 Zn compounds. *Indian Journal of Microbiology*, 50: 103-109. doi.org/10.1007/s12088-010-0066-1

43. Saravanan, V. S., Subramoniam, S. R., and Raj, S. A. 2003. Assessing in vitro solubilization potential of different zinc solubilizing bacterial (zsb) isolates. *Brazilian Journal of Microbiology*, 35 (1-2): 121-125. doi.org/10.1590/S1517-83822004000100020
44. Setia, R., Marschner, P., Baldock, J. and Chittleborough, D., 2010. Is CO₂ evolution in saline soils affected by an osmotic effect and calcium carbonate? *Biology and Fertility of Soils*, 46, pp.781-792. doi.org/10.1007/s00374-010-0479-3
45. Sharma, A., Patni, B., Shankhdhar, D. and Shankhdhar, S.C., 2013. Zinc—an indispensable micronutrient. *Physiology and Molecular Biology of Plants*, 19:11-20. doi.org/10.1007/s12298-012-0139-1
46. Shuman, L.M., 1986. Effect of ionic strength and anions on zinc adsorption by two soils. *Soil Science Society of America Journal*, 50(6): 1438-1442. doi.org/10.2136/sssaj1986.03615995005000060012x
47. Sposito, G., Lund, L. J., and Chang, A. C. 1982. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb in solid phases. *Soil Science Society of America Journal*, 46 (2): 260-264. doi.org/10.2136/sssaj1982.03615995004600020009x
48. Subramanian, K.S., Tensia, V., Jayalakshmi, K., and Ramachandran, V. 2009. Biochemical changes and zinc fractions in arbuscular mycorrhizal fungus (*Glomus intraradices*) inoculated and inoculated soils under differential zinc fertilization. *Applied Soil Ecology*, 49: 32-39. doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.05.009
49. Tessier, A.P.G.C., Campbell, P.C. and Bisson, M.J.A.C., (1979). Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. *Analytical Chemistry*, 51(7): 844-851.
50. Thind, S.S., Takkar, P.N. and Bansal, R.L., 1990. Chemical pools of zinc and the critical deficiency level for predicting response of corn to zinc application in alluvium derived alkaline soils. *Acta Agronomica Hungarica*, 39: 219-226.
51. Upadhayay, V.K., Singh, A.V. and Khan, A. 2022. Cross talk between zinc-solubilizing bacteria and plants: A short tale of bacterial-assisted zinc biofortification. *Frontiers in Soil Science*, 1, p.788170. doi.org/10.3389/fsoil.2021.788170
52. Wichern, J., Wichern, F. and Joergensen, R.G., 2006. Impact of salinity on soil microbial communities and the decomposition of maize in acidic soils. *Geoderma*, 137(1-2):100-108. doi.org/10.1016/j.geoderma.2006.08.001
53. Wu, S.C., Luo, Y.M., Cheung, K.C. and Wong, M.H., 2006. Influence of bacteria on Pb and Zn speciation, mobility and bioavailability in soil: a laboratory study. *Environmental Pollution*, 144(3): 765-773. doi.org/10.1016/j.envpol.2006.02.022
54. Xiang, H.F., Tang, H.A. and Ying, Q.H., 1995. Transformation and distribution of forms of zinc in acid, neutral and calcareous soils of China. *Geoderma*, 66(1-2): 121-135. doi.org/10.1016/0016-7061(94)00067-K
55. Yan, N., Marschner, P., Cao, W., Zuo, C. and Qin, W., 2015. Influence of salinity and water content on soil microorganisms. *International Soil and Water Conservation Research*, 3(4): 316-323. doi.org/10.1016/j.iswcr.2015.11.003
56. Yang, C., Lv, D., Jiang, S., Lin, H., Sun, J., Li, K. and Sun, J., 2021. Soil salinity regulation of soil microbial carbon metabolic function in the Yellow River Delta, China. *Science of the Total Environment*, 790, p.148258. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148258
57. Yasrebi, J., Karimian, N., Maftoun, M., Abtahi, A. and Sameni, A.M., 1994. Distribution of zinc forms in highly calcareous soils as influenced by soil physical and chemical properties and application of zinc sulfate. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 25(11-12): 2133-2145. doi.org/10.1080/00103629409369177